

Déterminants de la prise en charge de patients ayant un problème avec l'alcool en soins ambulatoires : revue de la littérature

C. Pascal, D. Tchimbakala , E. Malicher, D. Duhot *

*Le Dr Duhot a participé à une étude cofinancée par le laboratoire Lundbeck

10^e ANNIVERSAIRE
CONGRÈS
MÉDECINE GÉNÉRALE
FRANCE sous l'égide du **Collège
Médicins
Généralistes**



31 MARS
02 AVRIL
2016
PARIS
Palais des Congrès

L'Université Paris 13 est
membre fondateur de :




CAMPUS 
CONDORCET
Paris-Aubervilliers


Contexte

Quelques chiffres

Evolution de taux de la mortalité globale
(décès/1000 habitants) (Index mundi)



Mortalité globale
OMS2012



- Mortalité lié a l'OH
- Autre motifs de deces

1,2% des patients pris en charge pour des problèmes d'alcool par le MG (OMG 2009)

Thème de recherche



- ✓ Quels sont les déterminants de la prise en charge des patients ayant des problèmes liés à la consommation d'alcool en médecine générale ?
- ✓ L'objectif principal était d'identifier les déterminants « + » et « - » de cette prise en charge




Méthode I

- ✓ Revue systématique de la littérature internationale



- ✓ Trois bases de données



Méthode II

Soins primaire, attitudes, abus d'alcool

Critères de sélection
- français et anglais
- deux dernières décennies

1^{er} sélection
Notices bibliographiques

Articles sélectionnés

Critères d'exclusion
- autres thèmes que la PEC
de l'alcool en soins primaire

2^{ème} sélection
Lecture intégrale

Articles inclus




Résultats I

	N ^{bre} des notices bibliographiques	N ^{bre} d'articles sélectionnés	N ^{bre} d'articles inclus
Pub Med	70	21	16
Embase	64	2	1
Google scholar	46	13	10
N ^{bre} total des notices bibliographiques	180	35	27


Résultats II

- ✓ Analyse thématique de contenu
- ✓ Facteurs « + » et « - » identifiés
- ✓ Regroupement :
 - 3 concepts illustrant les facteurs « + »
 - 4 concepts illustrant les facteurs « - »

Résultats – facteurs positifs



Résultats – facteurs négatifs




Discussions (I)



- ✓ Déterminants de la PEC= pluri factoriels
- ✓ Manque de compétence/formation = thème le (+) récurrent
- ✓ Tentative formations en alcoologie pour MG : pas de réelle amélioration
- ✓ Vision intégrative pluridimensionnelle nécessaire
- ✓ S'inspirer des méthodes utilisées pour autres addictions ex. Tabac, toxicomanies

Discussions (II)

PEC en MG de 3 addictions



Données Observatoire de la Médecine Générale 1998 – 2009



Conclusions

- ✓ **Les facteurs identifiés ont permis de débiter une étude qualitative pour raffiner la compréhension des facteurs de la prise en charge des patients ayant des problèmes liés à la consommation d'alcool en médecine générale afin de développer des pistes d'amélioration.**

**Merci
de votre attention !**

- ✓ ceciliapsca04@gmail.com
- ✓ delphine.tchim@gmail.com
- ✓ elise.malichier@gmail.com
- ✓ d.duhot@ville-pantin.fr

